همبستگی بین روشهای مقابله با تنیدگی و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران قلبی کرونری

دكتر عليرضا آقايوسفي، دكتر نسيم شريف "٢

۱. دکترای تخصصی روانشناسی، دانشیار دانشگاه پیام نور تهران، ایران

۲. دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: شواهد فراوانی مبنی بر همبستگی بین روشهای مقابله با تنیدگی (استرس) و بیماری عروق کرونر قلب وجود دارد. لذا هدف اصلی این پژوهش، تعیین همبستگی بین روشهای مقابله با تنیدگی (استرس) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران عروق کرونر قلب بود.

مواد و روشها: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، تمام بیماران مبتلا به بیماری عـروق کرونـر قلـب (Disease روشها: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، تمام بیماران بودند. تعداد ۴۴ بیمـار مبـتلا بـه بیمـاری عـروق کرونـر قلـب بستری در بخشهای داخلی زنان، داخلی مردان و بخشهای خصوصی بیمارستان، به عنوان نمونه از بین بیماران واجد شـرایط انتخـاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامهی راههای مقابلهای-لازاروس و فولکمن و دستگاه فشار خون دیجیتال اومـرون اسـتفاده شـد. بـرای تحلیل آماری دادههای پژوهش، از شاخصها و روشهای آماری توصیفی و نیز ضـریب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون چنـد متغیری به روش گام به گام استفاده شد.

یافتهها: یافتهها نشان داد که بین روشهای مقابله با تنیدگی هیجان مدار با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، همبستگی مثبت و معنادار و نیز بین روشهای مقابله با تنیدگی مسأله مدار با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. ارزیابی مجدد مثبت از بین Λ راه مقابله با تنیدگی با اطمینان $99/ \cdot 0$ میتواند تغییرات مربوط به فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ییش بینی کند.

نتیجه گیری: افزایش کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی هیجان مدار باعث افزایش در سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می شود. افزایش در به کار گیری روشهای مقابله با تنیدگی مسأله مدار منجر به کاهش در سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می شود.

واژگان کلیدی: روشهای مقابلهای، تنیدگی (استرس) فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، بیماری عروق کرونر

لطفأ به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

Agha Yousefi AR, Sharif N. Relation between coping ways with stress and systolic and diastolic blood pressure in coronary heart disease. Pejouhandeh 2016;20(6):327-333.

مقدمه

بیماری کرونری قلب، بخشی از بیماریهای قلبی عروقی هستند که به دلیل تنگی عروق کرونر قلب یا انسداد این عروق ایجاد میشوند (۱). عامل اصلی در ایجاد این بیماری، عارضهی آترواسکلروز (AMD) میباشد، که منجر به پیدایش پلاکهای سخت در دیوارهی داخلی شریانهای کرونر می گردد که باعث تنگی یا انسداد این عروق میشود (۲). شواهد فراوانی مبنی بر

ارتباط میان تنیدگی و بیماریهای عروق کرونر وجود دارد. تنیدگی باعث افزایش ترشح کاتکولامین و کورتیکواستروئید از غدد درون ریز میشود. همچنین امکان دارد تنیدگی موجب بی نظمی در ضربان قلب، حملهی قلبی و مرگ ناگهانی شود (۳). به طور کلی تنیدگی یا استرس به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند استرسزا یا عامل تنیدگی نامیده میشود. لازاروس و همکاران روشهای مقابله را به عنوان مجموعهای از پاسخهای رفتاری و شناختی که هدفشان به حداقل رساندن فشارهای موقعیتهای تنیدگیزا است، تعریف کردهاند (۴). آنچه در فرایند بیماریهای مرتبط با تنیدگی بیش از خود تنیدگی و شدت آن اهمیت دارد، نوع

^{*}نویسنده مسؤول مکاتبات: دکتر نسیم شریف؛ دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه پیسام نسور تهران؛ پسست الکترونیسک: nasimsharif1982@yahoo.com

واکنش و مقابلهی فرد در برابر عامل تنیدگیزا است. مردم در مواجهه با موقعیتهای تنیدگیزا، از پاسخهای مقابلهای متفاوتی استفاده میکنند. به کارگیری انواع شیوههای مقابلهای کارآمد (مسألهمدار) و ناکارآمد (هیجان مدار)، پیامدهای متفاوتی بر سلامت جسمانی و روانی افراد دارد (۷). نتایج غالب پژوهشها، مقابلهی هیجانی را به عنوان مؤثر ترین واسطهی رابطهی تنیدگی- بیماری معرفی کردهاند (۵). پژوهشهای انجام شده در زمینهی نقش متغیرهای روانشناختی بر روند بهبود بیماران مبتلا به CHD نشان دادهاند که استفاده از روشهای مقابله مسأله محور در روند بهبود برخی از بیمارانی که دچار انفارکتوس قلبی بودند، مؤثر تر از روشهای مقابلهای هیجان محور بوده و این بیماران، سازگاری اجتماعی و روانی بیشتری را بعد از ترخیص از بیمارستان نسبت به افرادی که از روشهای مقابلهای

استرس و راههای مقابله با استرس، تأثیر بهسزایی بر فشار خون دارد. فشار خون ناشی از استرس، یک یافتهی شایع بوده و شیوع آن ۱۵ تا ۲۰ درصد میباشد (۷). گریسون و همکاران در جریان مطالعهای نشان دادند که استرس منجر به افزایش قابل توجهی در فشار خون سیتولیک، فشار خون دیاستولیک و مونوسیت-β۲ می گردد و نیز ذکر کردنـد کـه اوج پاسـخهـای روانی فیزیولوژیکی استرس، در افزایش خطر ابتلا به بیماریهای آترواسکلروتیک قلبی عروقی بسیار مؤثر است (۸). در پژوهشی دیگر، جت و همکاران به بررسی ارتباط بین غلظت سلولهای خون و فشار خون سیتولیک و دیاستولیک با استرس در طول یک هفته تنیدگی پرداختند. نتایج، نشان دهندهی افزایش در سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، هموگلوبین و هماتوکریت در نتیجهی عامل تنیدگیزا بود (۹). همچنین یولویک و همکاران در پژوهشی نشان دادنـد کـه استفاده از روشهای مقابلـه بـا تنیـدگی مسألهمدار، با كاهش در سطح فشار خون سيستوليك و دیاستولیک و نیز با تصویر ذهنی بهتر وکیفیت زندگی بالاتر در بیماران کرونری مرتبط میاشد (۱۰). در پژوهشی دیگر، ایلینز و همکاران نشان دادند که استرس، منجر به افزایش قابل توجهی در سطح فشار خون و ضربان قلب می گردد و افراد باید در موقعیتهای مختلف، از روشهای مقابلهای متفاوت استفاده نمایند. همچنین، تفاوتهای فردی افراد در پاسخ به تنیدگیهای روانی فیزیولوژیک با افزایش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی و عروق کرونـر قلـب، مـرتبط اسـت (۱۱). همچنین لایت و همکاران نشان دادند که استرس بالا

می تواند افزایش فشار خون سیستولی و دیاستولی را پیش بینی کند که در نهایت، فرد را در برابر بیماری عروق کرونر قلب آسیب پذیر می سازد (۱۲).

از آنجا که پژوهشهای دههی اخیر، بر نقش رابطهی ظرفیت سازش موجود زنده با بهداشت روانی تأکید می کنند و بسیاری از بیماریهایی که در گذشته صرفاً جسمانی تلقی میشدند، امروزه با عوامل تنیدگیزا، ظرفیت مقابله، روشهای مقابلهای و نهایتاً ظرفیت سازش روانشناختی در رابطه گذاشته می شوند (۱۴،۱۳) و با توجه به بروز و شـیوع روزافـزون بیمـاری عـروق کرونر قلب و تأکید روزافزون پژوهشگران عرصهی بهداشت و تندرستی بر همراهی و همبستگی بین عوامل زیستی روانی با بروز و تداوم بیماری های قلبی عروقی، ضرورت تحلیل همبستگی بین روشهای مقابله با تنیدگی با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران عروق کرونر قلب که هدف مطالعهی حاضر نیز می باشد، بیش از پیش احساس می گردد. همچنین، از آنجا که کاربرد روشهای مقابلهای ناکارآمد با تنیدگی، متأثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی نیز میباشند، انجام تحقیقات بومی و کاربردی و اصلاح راههای مقابلهای ناکارآمد در قالب آموزش عملی (مقابله درمانگری) که در حوزهی طب سلامتنگر نیز محسوب می شود، می تواند در برنامهریزیهای پیشگیری اولیه و ثانویه، مورد استفادهی جدی دستاندرکاران بهداشت جامعه و مراکز تشخیصی و درمانی قرار گیرد. تا آنجا که پژوهشگران مطلع می باشند، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران انجام می گیرد. در صورتی که یافتههای پژوهش حاضر در تحقیقات میدانی دیگر نیز مورد حمایت قرار گیرد، می توان از آن در برنامه ریزی های پیشگیرانهی اصلاح راههای مقابلهای ناکارآمد با تنیدگی در بيماريها، استفادهي بهينه بهعمل آورد.

مواد و روشها

جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، تمام بیماران مبتلا به CHD مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران در سال ۱۳۹۰ بودند. در ایس پـژوهش پـس از بررسـی طرح تحقیق توسط سه داور در معاونـت پژوهشـی بیمارسـتان قلب و عروق شهید رجایی تهران و تأیید ایـن پـژوهش و اخـن مجوز ورود به بیمارستان و بخشها، تعداد ۴۴ بیمار (۲۲ بیمار زن با میانگین سنی ۵۶/۵۰ سال و ۲۲ بیمار مـرد بـا میـانگین سنی ۵۷/۷۳ سـال) مبـتلا بـه CHD بسـتری در بخـشهـای داخلی زنان، داخلی مردان و بخشهای خصوصـی بیمارسـتان، به روش هدفمند انتخاب شـدند. تعـداد نمونـه براسـاس سـایر

مطالعات تعیین شد (۱۲٬۱۱٬۹٬۸). معیار ورود در این پـژوهش رضایت بیمار برای شرکت در پژوهش (ثبت نام)، نداشتن سابقهی بیماری جدی پزشکی غیر از CHD و شدت درگیری عروق کرونر حداقل در یکی از رگهای اصلی کرونر قلب با بیش از ۹۰ درصد گرفتگی با تأیید آنژیوگرافی بود. بخشهای دولتی و خصوصی در بیمارستان قلب شهید رجائی این امکان را فراهم ساختند که افراد متعلق به طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی در این پژوهش شرکت کننـد. مـدت بیمـاری، مـدت زمان بستری و شدت درگیری عروق کرونـر با استفاده از آنژیوگرافی بر اساس تعداد رگ درگیر و شدت تنگی و دیگر اطلاعات مورد نیاز، از پروندهی پزشکی بیماران استخراج شد. همچنین پس از توضیح علل پژوهش و اهداف انجام آزمایشهای لازم و دریافت رضایتنامهی کتبی از همهی بیماران شرکت کننده در این پژوهش، پرسشنامهی راههای مقابله با تنیدگی در مورد آنها اجرا شد. سپس فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران با استفاده از دستگاه فشار خون دیجیتال اومرون اندازه گیری شد.

پرسشنامه ی راههای مقابلهای فولکمن - لازاروس (۴) هشت راه مقابلهای را که شامل مقابلههای مسأله مدار که عبارتنـد از جستجوی حمایت اجتماعی، مسؤولیت پذیری، حل مدبرانه مسأله ارزیابی مجدد مثبت و مقابلههای هیجان مدار که شامل مقابله رویاروی گر، دوری جویانه، اجتناب و خویشتن داری می باشند را مورد سنجش قرار می دهد. این آزمون مشتمل بر ۶۶ ماده است که از طریق علامت گذاری روی مقیاس لیکرت از صفر تا سه (به کار نمی برم صفر، تاحدی به کار بردم ۱، بیشتر مواقع به کار بردم ۲، زیاد به کار بردم ۳) نمره گذاری می شوند. ضریب پایایی کل آزمون برای آزمودنیهای ایرانی ۱۸/۰، خردهمقیاسهای مسأله مدار ۰/۷۰ و خرده مقیاسهای هیجان مدار ۴۹/۰ گزارش شده است (۱۵). ضریب همبستگی آن برای روشهای های مقابله ای هیجان مدار ۷۸٪ و برای روشهای مقابلهای مسأله مـدار ۸۰٪ بـهدسـت آمـده اسـت و وسیلهی مناسبی برای پـژوهشهـای روانشـناختی مـیباشـد (۱۸–۱۸). همچنین اعتبار پرسشنامهی روشهای مقابلهای از طریق آزمایش ثبات درونی اندازههای مقابلهای که بهوسیلهی ضریب آلفای کرانباخ به دست میآید، ارزیابی شده است. برآورد ثبات درونی اندازههای مقابلهای عموماً در کران پایینی دامنهی قابل قبول رایج قرار می گیرد. فولکمن و لازاروس، ثبات درونی ۰/۷۹ تا ۰/۶۶ را برای هریک از روشهای مقابلهای گزارش کردهاند (۱۵). اندازهگیری فشار خون با استفاده از دستگاه فشار خون دیجیتال اومرون صورت

گرفت. برای تحلیل آماری دادههای پـژوهش، از شـاخصهـا و روشهای آماری شـامل میـانگین، انحـراف اسـتاندارد، ضـریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری با نرمافزار SPSS نسخهی ۱۷ استفاده شد.

ىافتەھا

۲۲ بیمار مرد و بیمار زن، بررسی شدند. ۱۵، ۲۱ و Λ نفر به ترتیب در رده سنی ۴۵ تا ۵۵، ۵۵ تا ۶۵ و ۶۵ سال به بالا قرار داشتند. ۲۴ نفر مدرک دیپلم، ۱۲ نفر فوق دیپلم و Λ نفر لیسانس داشتند. بیشترین نمره متعلق به "ارزیابی مجدد مثبت" و کمترین نمره مربوط به "رویاروی گر" بود (جدول ۱).

جدول ۱. توزیع میانگینهای نمرات روشهای مقابله با تنیدگی بیماران عروق کرونر قلب مورد مطالعه.

انحراف استاندارد	میانگین	روشهای مقابله با تنیدگی		
۴/۰	11/8	جستجوى حمايت اجتماعي		
7/4	٨/۶	مسؤوليت پذيرى		
4/4	11/9	حل مدبرانه مسأله		
4/4	14/4	ارزيابي مجدد مثبت		
4/8	٩/٨	رویاروی گر		
4/4	٩/٨	دوری گزین		
4/4	1 • /Y	خویشتن داری (خودمهار گری)		
۵/۱	11/4	گریز و اجتناب		

بین کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی هیجان مدار (رویاروی گر، دوری جویانه، خویشتنداری و گریز و اجتناب) با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین، بین کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی مسأله مدار (جستجوی حمایت اجتماعی، مسؤولیت پذیری، حل مدبرانه مسأله ارزیابی مجدد مثبت) با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، همبستگی منفی و معنادار دیده شد (جدول ۲). از بین ۸ راه مقابله با تنیدگی، فقط راه مقابلهای دوری جویانه، پیش بینی کننده ی معناداری برای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بود و همان طور که مشاهده می شود ۴۹/۰ واریانس فشار خون سیستولیک و ۲/۴۰ واریانس فشار خون سیستولیک ییش بینی واریانس فشار خون دیاستولیک ییش بینی واریانس فشار خون دیاستولیک بیش بینی ویرسیون آن به شرح زیر می باشد:

 $y_i = eta_0 + eta_1 x_{i1} + eta_2 x_{i2} + \dots eta_p x_{ip} + arepsilon$ خطا+دوری جویانه×(۰/۷۰۴)=فشار خون سیستولیک $y_i = eta_0 + eta_1 x_{i1} + eta_2 x_{i2} + \dots eta_p x_{ip} + arepsilon$ خطا+دوری جویانه×(۰/۷۴۳) = فشار خون دیاستولیک

جدول ۲. ضرایب همبستگی پیرسون بین روشهای مقابله با تنیدگی (مسأله مدار و هیجان مدار) بیماران عروق کرونر قلب با فشار خون
سیستولیک و دیاستولیک در آنها.

±=1:	فشارخون سيستوليك		فشارخون دياستوليك		
نام متغير	همبستگی	همبستگی معناداری		همبستگی معناداری	
جستجوى حمايت اجتماعي	-•/۶۶	•/••1	-• /۶ ۵	•/••1	
مسئوليت پذيرى	- • / ۶ •	•/••1	-•/ △ ∧	•/••1	
حل مدبرانه مسأله	-•/△9	•/••1	-•/ ∆ ∧	•/••1	
ارزيابي مجدد مثبت	-•/ ۶۴	•/••1	-•/ △ ∧	•/••1	
رویاروی گر	• /Y •	•/••1	• 188	•/••1	
دوری گزینی	• /Y •	•/••1	•/81	•/••1	
خویشتنداری (خودمهارگری)	٠/۵٩	•/••1	• / ۶ •	•/••1	
گریز و اجتناب	·/8AY	•/••1	• / 8 •	•/••1	

جدول ۳. رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام مربوط به فشار خون سیستولیک و دیاستولیک.

فشار خون سيستوليک										
مقدار خطای استاندارد	Rاسکور	R	سطح معناداري	ضريب F	ميانگبن مجذورات	درجه آزادی	ع مجذورات	مدل مجمو		
1/1	./49	٠/٧٠	•/••1	41/7	44/0	١	44/0	رگرسيون		
					1/1	47	40/4	باقيمانده		
سطح معنادار		T	Bet	استاندارد a	B ضریب	ب غيراستاندارد	ضريد	متغير		
						17/7		(Constant)		
•/••1		۶/۱	f	•/Y•		•/٢٣		دوری جویانه		
			لیک	ون دياستوا	فشار خو					
مقدار خطای استاندارد	Rاسکور	R	سطح معناداري	ضریب F	ميانگبن مجذورات	درجه آزادی	ع مجذورات	مدل مجمو		
٠/۵٨	٠/۴٧	٠/۶٨	•/••1	٣٨/٣	۱۲/۸	١	۱۲/۸	رگرسيون		
					٠/٣	47	14/	باقيمانده		
سطح معنادار		T	Beta	استاندارد a	B ضریب	ب غيراستاندارد	ضريا	متغير		
						٨/١		(Constant)		
•/••1		8/1		٠/۶٨		-/17		دوری جویانه		

ىحث

پژوهشها نشان دادهاند که تنیدگیهای هیجانی می تواند منجر به میکروترومبی در عروق کوچک گردد و تنیدگی موجب بالا رفتن هوموسیستئین (یک آمینواسید شناخته شده است که عامل خطرسازی برای عروق کرونر می باشد) سرم شده و از این راه قلب را رنجور می سازد (۲۰،۱۹). در گزارشی دیگر آمده است که تنیدگی ممکن است به طور مستقیم روی عروق کرونر تأثیر گذاشته و منجر به حملهی قلبی گردد. به هر حال از نظر پاتوفیریولوژی و سایکوفارماکولوژی تأیید کردهاند که در طول تنیدگی، کاتکولامین، کورتیزول و تون سمپاتیک افزایش می یابد و در نتیجه موجب کاهش پتاسیم قلب به خصوص در میوکارد می شود که بدین ترتیب آستانهی تحریک الکتریکی میوکارد را پایین آورده و توسعه ی آریتمی را تسهیل می کند (۲۱). از این رو، در سالهای اخیر توجه به منابع تنیدگی و روشهای مقابله با آن در گروههای مختلف

به ویژه در مبتلایان به بیماریهای قلبی، بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده که به کارگرفتن روشهای مقابلهای مؤثر، نقش مهمی در کاهش تنیدگی داشته است (۲۲). زیرا انتخاب راههای مقابلهی مناسب در برابر فشارهای روانی ایجاد شده میتواند از تأثیر فشارها بر سلامت روانی و میزان بیوماکرهای ایمنی شناختی در بیماران عروق کرونر قلب بکاهد.

یافته های پژوهش نشان داد که بین کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی هیجان مدار با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران عروق کرونر قلب، همبستگی مثبت و رابطهی معناداری وجود دارد، به این معنی که افزایش کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی هیجانمدار در این بیماران، منجر به افزایش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در آنان می شود. این یافته ها با نتایج پژوهشهای پیشین که

نشان دادند بیماران عروق کرونری در مقابله با تنیدگی و فشارهای وارده بیشتر از افراد سالم از روشهای مقابلهای با تنیدگی هیجان مدار استفاده میکنند و نیز استرس و روشهای مقابلهای هیجان مدار با استرس منجر به افزایش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می شود، همسو است (۲۴٬۲۳٬۹٬۸). به طور کلی، روشهای مقابلهای به عنوان کوششهایی هیجانی، شناختی و رفتاری به منظور افزایش تطابق فرد با محیط و یا تلاشهایی برای پیشگیری از پیامدهای منفی شرایط فشارزا توصیف شده است (۲۵). این یافته بدین معنا است که اگر این روشهای مقابله با تنیدگی از نوع مؤثر، با کفایت و سازگارانه باشد تنیدگی کمتر فشارزا تلقی میشود و واکنش نسبت به آن نیز در راستای کاهش پیامدهای منفی آن خواهد بود ولی اگر سبک یا روش مقابله هیجان مدار، ناسازگار و ناکافی باشد نه تنها تنیدگی را کنترل نمى كند، بلكه خود اين واكنش، منبع فشار به شمار آمده و باعث افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک خواهد شد. همچنین نتایج اغلب پژوهشها، روشهای مقابلهای هیجان مدار را مهم ترین واسطه ی تنیدگی - بیماری نامیدهاند و نشان دادهاند که استفاده از روشهای هیجان مدار با ارزیابی منفی از تنیدگی و در نتیجه میزان تنیدگی بالاتر و کیفیت زندگی پایینتر (۲۶) و افرایش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران عروق کرونر قلب (۱۱،۸) همراه است. همچنین پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که استفاده از روشهای مقابلهای هیجان مدار با تنیدگی منجر به افزایش افسردگی و ناکارآمدی در شخص گردیده و به طبع آن فرد را بیش از پیش در مواجهه با استرسورها ناتوان ساخته و بر فشار خون تأثیر منفی گذاشته و او را مستعد به انفــار کتوس قلبی مینماید. از آنجا که در موارد بروز تنیدگی، سیستمهای زیستی، ایمنی، روانی و اجتماعی به صورتی در هم تنیده و یکپارچه عمل میکنند، تنیدگی و عدم کاربرد روشهای مقابلهای مناسب با آن می تواند موجب فرسودگی های جسمی روانی و اجتماعی گرده و از طریق تغییرات رفتاری و فیزیولوژیک بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تأثیر منفی بگذارد (۲۷،۱۳).

نتیجهی دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی مسأله مدار با فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران عروق کرونر قلب، همبستگی منفی و رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که افزایش کاربرد روشهای مقابله با تنیدگی مسأله مدار منجر به کاهش در سطح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در این

بیماران می گردد. این یافته نیز با نتایج پـژوهشهای پیشین همگرا است (۱۱،۱۰). به طور کلی، روشهای مقابله متمرکز بر مسأله شامل فعالیتهای مستقیم روی محیط بـه منظور تغییر یا اصلاح شرایطی است که تهدیـدآمیز تلقـی شـده و در موقعیتهایی بروز می کند که بیمار احساس کنـد مـی توانـد موقعیت را کنترل کرده یا تغییر دهد (۲۸). برخی از روشهای عملی در این شیوه عبارتنـد از: استفاده از تجربیات گذشـته، واقع بینـی، جمعآوری اطلاعـات بیشـتر بـرای حـل مشـکل یا مشورت و توجه به نقاط مثبـت مسأله. روش حـل مشـکل یا متمرکز بر مسأله به عنوان مناسبترین و سازگارترین شـیوهی متمرکز بر مسأله به عنوان مناسبترین و سازگارترین شـیوهی کنترل تنیدگی محسوب شده و استفاده از آن با سلامتی روانی بیمار و کاهش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ارتباط مستقیم دارد (۲۹).

همچنین در این پـژوهش نشـان داده شـد کـه تنهـا، روش دوری جویانه، تعیین کننده ی معناداری برای فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بوده است. در تأیید این یافته می توان گفت که افراد با به کارگیری روشهای مقابلهای کارآمد در مقابل مشکلات و تنیدگی آمادگی بیشتری یافته و توان مقابلهی بیشتری را تجربه می کنند. بیماری عروق کرونر قلب به عنوان یک وضعیت استرسزا، واکنشی را به همراه دارد که شامل پاسخهای هیجانی، جسمانی و روانی میباشد این امر سبب فشار روانی شده و بیماران در پی آن هستند که این شرایط استرسزا را کنترل، اداره و یا با این شرایط کنار آمده و با آن زندگی کنند. این در حالی است که شیوههای هیجان مدار مانند روش دوری جویانه می توانند باعث کاهش تلاش بیمار جهت حل مشکل شوند و بدین ترتیب مشکل بیمار برطرف نشده و در مواردی به صورت مزمن و پیشرفته در میآید و منجر به افزایش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک می گردد. بنابراین، روش کنترل هیجان مدار همیشه مناسب نبوده و فقط در موقعیتهای غیر قابل کنتـرل، مناسب میباشد. بنابراین می توان گفت شیوه ی مقابله با تنیدگی مسألهمدار، همواره به عنوان روش مطلوب و مناسب، مورد استفاده قرار می گیرد (۳۰).

دیدگاههای جدید در مورد تنیدگی به جای تمرکز بر ماهیت تنیدگی و اهمیت آن به نقش منابع روانشناختی فرد در رویارویی با عوامل فشارزا یا تغییر و بهبودی در احساسات ناشی از این عوامل تأکید دارند، زیرا از این طریق می توان تدابیر درمانی مناسب برای کمک به فرد تحت فشار، فراهم کرد. بنابراین چگونگی مقابله افراد باتنیدگی از شدت فراوانی آن مهم تر است (۳۱). استفاده از روشهای مقابلهای مسألهمدار

سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تلقی گردد. تمرکز بر مداخلات روانشناختی از جمله فن مقابله درمانگری که روشی برای درمان بیماران روانشناختی و نیز بیماران مبتلا به پیامدهای جسمانی تنیدگی و هم به عنوان روشی برای آموزش مهارتهای مقابلهای کارآمد به شمار میآید، باید جزء مهم پروتکل درمانی بیماران قلبی عروقی در نظر گرفته شود.

همچنین، محدودیت نمونه ی آماری پژوهش به دلایل شرایط جسمی خاص بیماران بستری در بیمارستان و کسب رضایت از آنان جهت شرکت در پژوهش و عدم امکان بررسی روی افراد فاقد بیماری عروق کرونر قلب و مقایسه بین دو گروه افراد دارای بیماری کرونر قلب و فاقد این بیماری و نیخ انتخاب بیماران از یک شهر و یک بیمارستان، محدودیتهایی انتخاب بیماران از یک شهر و یک بیمارستان، محدودیتهایی متغیرهای مورد بررسی مطرح می کند که باید در نظر گرفته شود. پیشنهاد میشود این پژوهش، روی سایر بیماران نیخ انجام پذیرد و در پژوهشهای دیگر به مطالعه و کنترل متغیرهای میانجی دیگر مانند وضع تأهل، تعداد فرزندان و سپرداخته شود و نمونه با حجم بیشتر به خصوص نزدیک به جامعه ی آماری جهت سنجش رابطه بین متغیرهای پژوهش، جامعه ی آماری جهت سنجش رابطه بین متغیرهای پژوهش، به کاربرده شود.

با تصور ذهنی بهتر و کیفیت زندگی بالاتری در بیماران کرونری مرتبط میباشد (۱۰). پـژوهشهـا نشـان دادهانـد کـه استفاده از روشهای مقابلهای مسأله مدار، باعث افزایش هدفمندی، اعتماد به نفس و افزایش روحیهی بیمار شده و بر سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تأثیر منفی نمی گذارد (۳۲). همچنین مطالعات مختلف نشان دادهاند که بیماران عروق کرونر قلب که از روشهای مسألهمدار و مثبتتر در مقابل تنیدگی استفاده می کنند کمتر از افرادی که از راهبردهای هیجان مدار و منفی تر مانند اجتناب و انکار استفاده می کنند، در معرض افسر دگی و حملات قلبی قرار دارند (۳۵٬۳۳) و در نتیجه، سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در این بیماران پایینتر است. همچنین، انتخاب راههای مقابلهای مناسب در برابر با تنیدگی های ایجاد شده، می تواند از تأثیر تنیدگیها بر سلامت روانی بیمــار بکاهــد و در نتیجه، به سازگاری و انطباق هر چه بیشتر و عدم افزایش در سطوح فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیانجامد.

نتيجهگيري

کاهش روشهای مقابلهای هیجان مدارانه و اجتنابی و ناکارآمد در بیماران عروق کرونر قلب و افزایش روشهای سازگارانه همچون مقابلهی مسأله مدار و شناختی مؤثر، می تواند به عنوان سپر محافظ در مقابله با تنیدگی و کاهش

REFERENCES =

- 1. Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP. Eds. In: Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 1997. p. 118–28.
- 2. Andreoli TE, Carpenter CCJ, Griggs RC, Loscalzo J, eds. In: Cecil Essentials of Medicine. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2001. p. 123–358.
- 3. Brammer LM, Abrego P, Shostrom EL. Therapeutic counseling and psychotherapy. 6th ed. NewYork: Prentice Hall; 2005. p. 45–120.
- 4. Lazarus RS, Folkman S. Stress, Appraisa and Coping. 1st ed. New York: Springer; 1984. p. 380-90.
- 5. Pakenham K. Coping with multiple sclerosis: Development of a measure. Psychol Health Med 2004;6:411-28.
- 6. Keckeisen ME, Nyamathi AM. Coping and adjustment to illness in the acute myocardial infraction patient. J Cardi Nurs 1990;5:25–33.
- 7. Braunwald EZ. Heart disease. A textbook book of cardiovascular Medicine. 7th ed. Philadelphia: W.B. Saunder's Co. 2005.
- 8. Greeson JM, Lewis JG, Achanzar K, Zimmerman E, Kenneth H. Stress-induced change in the expression of monicytic β 2-integrins: The impact of arousal of negative affect and adrenergic responses to yhe anger recall. Brain Behav Immun J 2009;23(2):251–6.
- 9. Jet JCS, Zanten V, Ring C, Carroll D, McIntyre D, Brown MD. Hemoconcentration during a prolonged stress task: Associations with hemodynamic reactivity and microvascular permeability. Biol Psychol 2009;82(3):260–6.
- 10. Ulvik B, Nygard O, Hanestand BR, Wentzel-Larsen T, Wahl AK. Associations between disease severity, coping and dimenitions of health-related quality of life in patients admitted for elective coronary angiography-across sectional study. Health Qual Life Outcome 2008;29(6):38–46.

- 11. Ellins E, Halcox J, Donald A, Field B, Brydon L, Deanfield J, *et al.* Arterial stiffness and inflammatory response to psychophysiological stress. Brain Behav Immun J 2008;22(6):941–8.
- 12. Light KC, Girdler SS, Sherwood A, Bragdon E, Brownley K, West SG. High stress responsively predicts later blood pressure only in combination with positive family history and high life stress. Hypertension1999;33(1):1458–64.
- 13. Tiomothy W, Smith M. Psychosocial influence on the development and course of coronary heart disease: Current status and implication for research and practice. J Consult Clin Psychol 2002;70(3):548–68.
- 14. Sadock B, Sadock V. Kaplan and Sadock's comprehensive textbooks of psychiatry. 8th ed, New York: Williams Wilkins; 1998.
- 15. Hosseinzadeh M. The study of changes identity styles and coping styles in student.s academic achievement. Tabriz: Tabriz University Publications; 2008. p. 132–4. (Text in Persian)
- 16. Folkman S, Lazarus RS, Pimley S, Novacek J. Age differences in stress and coping processes. Psychol Aging 1987; 2:171–84.
- 17. Folkman S, Lazarus RS, Gruen R, Delongis A. Apprasial, coping, health status and psychological symptoms. J Pers Soc Psychol 1986;50:571–9.
- 18. Bllings AG, Moos RH. Coping stress and social resources among adults with unipolar depression. J Pers Soc Psychol 1984;46:877–91.
- 19. Fukai A, Koyanagi S, Takhesite A. Role of coronary monospasm in the pathogenesis of myocardial infarction. study in patient with no significant coronary stenosis. Am Heart J 1993;126:1305–11.
- 20. Ghiansoni L, Donald AE, Cropley M, Mullen MJ, Okley Tylor M, *et al.* Mental stress induces transient endothelial dysfunction in humans. Circulation 2000;102:2473–8.
- 21. Mc Cance AJ, Forfar JC. Myocardial ischemia and venricular arrhythmia in patient precipitated by physiological concentration of adrenalin in patient with coronary heart diseases. Br Heart J 1991;66:316–9.
- 22. Bolhari J, Ehsan Manesh M, Kismi E. The relationship between stress factors, Rates of Trust of God and Stress syndrome in medical students. J Thoughts Behav1999;1(6):25–34. (Full Text in Persian)
- 23. Chiou A. Anxiety, depression and coping methods of hospitalized patients with myocardial infarction in Taiwan. Int J Nurs 1997;34(4):305–11.
- 24. Damsa T. Ischemic heart disease in relation whit the type of behavior and the emotional state. Institute of internal medicine Bucharest, Romania. Med Interne 1988;26(1):39–46.
- 25. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. NewYork: Spinger; 1989. p. 234-44.
- 26. Besharat MA, Pourrang P, Sadeghpour Tabaee A, Pournaghash Tehrani S. The relationship between coping styles and psychological adaptation the recovery process: Patients with coronary heart disease. J Tehran Univ Med Sci 2007;66(8):573–9. (Full Text in Persian)
- 27. Brantley PJ, Grothe KB, Dutton GR. Stress anger, and hostility in coronary heart disease. In: Nikcevic AV, Kuczmperczyk AR, Bruch M, eds. Formulation and treatment in clinical health psychology. New York: Routledge; 2006. p. 109–22.
- 28. Kleinke CH. Coping with life challenge. 2nd ed. NewYork: Co-publishing Company: USA; 1998. p. 1324.
- 29. Farmanbar R. Investigation of control methods to cope with stress in patients with ischemic heart Cardiology clinic in one of the hospitals in Rasht. J Colleges Nurs Midwifery (Gilan Province) 1999;36:56–64. (Full Text in Persian)
- 30. Agha Yousefi A, Sharif N, Alipour A, Shaghaghi F. Analysis of the relation between coping ways with stress and cardiac biomarker troponin I in coronary heart disease patients. Hormozgan Med J 2014;18(2):103–12. (Full Text in Persian)
- 31. Tery DJ. Determinants of coping: the role of state and situational factors. J Pers Soc Psychol1994;66:895-910.
- 32. Gary M. Coping and behavior diabetes. Life Styldibet Spectrum 2000;13(3):167-73.
- 33. Denollet J. Type D Personality: A potential risk factor refined. J Psychosom Res 2000;49(4):255-66.
- 34. Burker EJ, Evon DM, Losielle MM, Finkel JB, Mill MR. Coping predicts depression and disability in heart trans plant condidates. J Psychosom Res 2005;59(4):215–22.
- 35. Murberg TA, Bru E, Aarsland T. Personality as predictor of mortality among patients with congestive heart failure: a two year follow up study. Pers Individ Differ 2001;30(5):749–57.